

LEMTRADA-behandling kan öka risken för:

- > Autoimmuna sjukdomar som:
 - > En blödningsrubbning som heter immunologisk trombocytopeni (ITP)
 - > Sällsynta njursjukdomar, såsom antiglomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM)
 - > Sköldkörtelrubbningar (hypo-/hypertyreos)
- > Allvarliga infektioner

Läkare: Se produktresumén för mer information.

		MS-sjuksköterska
		Husläkare
		Neurolog
Telefon/Fax	Namn	

Patientens namnteckning:

Patientens namn:

Min läkare som förskriver LEMTRADA kan nås på nedanstående nummer. Övriga läkare eller vårdpersonal som är involverade i min vård kan också finnas angivna.
Om några medicinska undersökningar genomförs, vänligen skicka kopior på samtliga journaler, inklusive eventuella behandlingar och/eller provsvar, till läkaren(-arna) på nedanstående lista.

LEMTRADA[®]
alemtuzumab^{12mg}

Patientvarningskort

Visa detta kort för all akut- och vårdpersonal

Jag har behandlats med LEMTRADA, en behandling för multipel skleros (MS), som påverkar immunförsvaret. Jag deltar i ett uppföljningsprogram som fortsätter varje månad under 4 år efter min sista behandling.

Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:

Kontakta din neurolog omedelbart för att informera om dina symtom oavsett om de är nya, förvärrade eller återkommande. Om du inte kan komma i kontakt med din egen läkare, sök omedelbart medicinsk vård. Visa dem detta kort!

Immunologisk trombocytopeni (ITP)

- > Små, spridda prickar på huden som är röda, rosa eller lila
- > Benägenhet för blåmärken
- > Blödning från en skada som är svårare än vanligt att få stopp på
- > Rikligare, längre eller tätare menstruationer än normalt.
- > Blödningar mellan menstruationer
- > Blödning från tandköttet eller näsan som är ny eller tar längre tid än vanligt att stoppa
- > Blodiga upphostningar (kan också vara ett symtom på njursjukdom)

Njursjukdom

- > Blod i urinen – den kan vara röd eller tefärgad
- > Svullnad i benen eller fötterna

Allvarliga infektioner

- > Feber och/eller frossa
- > Svullna körtlar
- > Andfåddhet, hosta, väsande andning, bröstsmärta eller trånghet i bröstet och blodiga upphostningar

Infektioner kan ge ovanstående besvär men du kan även uppleva andra symtom.

Biverkningar kan uppkomma lång tid efter att du har fått en behandlingskur med LEMTRADA. **Det är mycket viktigt att du fortsätter att lämna dina prover varje månad (även om du mår bra).**



Du måste även fortsätta att vara uppmärksam på tecken och symtom.



Detta gäller under 4 år efter din sista infusion.



Tidig upptäckt och diagnos ger dig bästa möjligheten till framgångsrik behandling.